АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

116

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

17-18 октября 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АККРЕДИТОВАНО
Кредитов: **12**

Соответствует требованиям для НМО

Участие в Форуме бесплатное!

www.arfpoint.ru

Всероссийский образовательный форум

ARFPOINT.RU

II-е полугодие 2019

«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход»

Калининград
6 сентября

Второй Международный Конгресс по акушерской анестезиологии. Памяти Джеймса Янга Симпсона. III Пленум Правления АААР
21–23 сентября

Махачкала
9–10 октября

Екатеринбург
17–18 октября

Пенза
31 октября

Омск
14–15 ноября

Мурманск
29 ноября

Ростов-на-Дону
12 декабря

Брянск
20 декабря

116

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД

Место проведения:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1», актовый зал.
620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185



www.arfpoint.ru

За шесть лет Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» прошёл путь от камерного мероприятия до события международного масштаба. Мы рады встрече с вами, рады вашему нарастающему интересу к нашей совместной деятельности.

Идейными вдохновителями и сопредседателями Форума выступают: президент АААР Шифман Е.М. (д.м.н., профессор) и вице-президент Куликов А.В. (д.м.н., профессор).

Участники образовательных форумов получают баллы по системе НМО. Ассоциация состоит в числе членов Торгово-промышленной палаты РФ, а также является активным участником НП «Национальная медицинская палата», собравшей под своим крылом многие профессиональные медицинские сообщества и активно внедряющей инновации в систему здравоохранения России.

Вся деятельность Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов обусловлена целью снижения материнской и перинатальной смертности в РФ. Одной из основных задач Ассоциации является разработка и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по анестезии и интенсивной терапии при критических ситуациях в акушерской практике. Клинические рекомендации утверждены профильной комиссией Министерства здравоохранения РФ, признаны национальными и размещены на сайте АААР: www.arfpoint.ru. Весной 2019 года было издано четвертое издание Клинических рекомендаций, вобравшее в себя опыт лучших отечественных специалистов в акушерской анестезиологии.

Ассоциация ААР выпускает и размещает на своем сайте онлайн-журнал «Вестник акушерской анестезиологии». На сегодняшний день аудитория онлайн-журнала — это более 3500 членов Ассоциации. Каждый выпуск дублируется на Facebook АААР.

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! Приглашаем вас присоединиться к нам, вступив в члены Ассоциации! Мы открыты для новых лиц и новых идей. И совсем не важно, какая у вас медицинская специальность – всех нас объединят одна цель – облегчить страдание наших женщин и сделать процесс деторождения как можно более безопасным и комфортным!

ШИФМАН
Ефим Муневич
Президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов

КУЛИКОВ
Александр Вениаминович
Вице-Президент Ассоциации
акушерских анестезиологов-реаниматологов

- Министерство здравоохранения Свердловской области
- ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»
- ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
- Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
- Ассоциация анестезиологов-реаниматологов Урала
- Национальная Медицинская Палата
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации
- Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
- Кафедра анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России

Министерство здравоохранения Свердловской области

Зильбер Наталья Александровна
к.м.н., начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области (Екатеринбург)

Левит Александр Львович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, заведующий ОАР СОКБ
(Екатеринбург)

Каюмова Алена Владимировна
к.м.н., врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, Ассистент кафедры Акушерства и гинекологии ФПК и ПП педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ СО Областной перинатальный центр
(Екатеринбург)

Матковский Андрей Анатольевич
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница № 1, ОПЦ
(Екатеринбург)

Шифман Ефим Муневич

д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» (Москва)

Куликов Александр Вениаминович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)

2020

Всероссийский образовательный форум

«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход»

20 февраля Уфа

28 февраля Барнаул

13 марта Пермь

19-20 марта Красноярск

23 апреля Самара

29 апреля Саратов

21-22 мая Кемерово

3-4 июня Конгресс памяти ак. Гельфанада «Сепсис. Кровотечения. Тромбозы» Москва

18 июня Якутск

Южно-Сахалинск 15 сентября

Владивосток 17 сентября

Петропавловск-Камчатский 21 сентября

4 Съезд ААДР Москва 26-27 сентября

Симферополь 22 октября

Чита 29 октября

Сургут 14 ноября

Иваново 26 ноября

Челябинск 10 декабря

Воронеж 24 декабря

Конгресс памяти акад. Б.Р. Гельфанда «СЕПСИС. КРОВОТЕЧЕНИЯ. ТРОМБОЗЫ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

Москва, 3-4 июня 2020 г.

Отель Holiday Inn Moscow Sokolniki, г. Москва, ул. Русаковская, д.24



www.arfpoint.ru

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОНГРЕССА:

1. **Острая кровопотеря**
2. **Венозные тромбоэмболические осложнения.**
3. **Сепсис.**
4. **Нозокомиальные инфекции.**
5. **Внебольничные инфекции.**
6. **Эфферентные методы детоксикации.**

СООБЩЕСТВО АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ СТОЛИЦЫ

Сопредседатели:

Проценко Денис Николаевич
к.м.н., главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница имени С.С. Юдина ДЗМ, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Главный (внештатный) анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, президент АААР, член Президиума ФАР, заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» (Москва)

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)

Оргкомитет: aaar@arfpoint.ru +7 926 379-67-05

ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
08:30 – 09:30	**Регистрация участников**	
09:30 – 09:40	Открытие 116-го Форума. Приветственное слово	
09:40 – 10:20	**Лекция:** Внебольничная пневмония. Особенности течения и интенсивной терапии в XXI веке.	**Левит Александр Львович** (Екатеринбург)
10:20 – 11:00	**Лекция:** Трансфузионная стратегия и тактика при острых нарушениях гемостаза в акушерстве.	**Куликов Александр Вениаминович** (Екатеринбург)
11:00 – 11:30	**Лекция:** Комплемент-блокирующая терапия при акушерских тромботических микроангиопатиях.	**Коротчаева Юлия Вячеславовна** (Москва)
11:30 – 11:50	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
11:50 – 12:00	**Перерыв. Осмотр выставки**	
12:00 - 12:30	**Лекция:** Применение факторов свертывания крови при массивных акушерских кровотечениях. Опыт областного перинатального центра.	**Матковский Андрей Анатольевич** (Екатеринбург)
12:30 – 13:00	**Лекция:** Методы хирургического гемостаза при массивной кровопотере в акушерстве.	**Жилин Андрей Владимирович** (Екатеринбург)
13:00 – 13:20	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
13:20 – 14:00	**Перерыв**	
14:00 – 14:30	**Лекция:** Тромбопрофилактика в периоперационный период операции кесарево сечение.	**Шифман Ефим Муневич** (Москва)

ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК

СЕКЦИЯ: Тяжелые инфекции в ОРИТ и сепсис*

14:30 - 15:10	**Лекция:** Диагностика и общие принципы терапии тяжелых инфекций в ОРИТ. Поддерживающая терапия сепсиса.	**Проценко Денис Николаевич** (Москва)
15:10 – 15:50	**Лекция:** Принципы антимикробной терапии тяжелых нозокомиальных инфекций в ОРИТ.	**Яковлев Сергей Владимирович** (Москва)
15:50 - 16:30	**Лекция:** Инвазивные микозы в ОРИТ: алгоритмы диагностики и лечения, современные клинические рекомендации.	**Климко Николай Николаевич** (Екатеринбург)
16:30 – 17:00	**Лекция:** Особенности антимикробной терапии тяжелой внебольничной пневмонии у особых групп пациентов.	**Яковлев Сергей Владимирович** (Москва)
17:00 - 17:20	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
17:20 – 17:30	**Подведение итогов дня**	

*- При поддержке компании – спонсора.

ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
09:00 – 09:30	**Повторная регистрация** **Регистрация новых участников**	
09:30 – 10:10	**Представление клинических рекомендаций:** Преэклампсия. Приказ. Комментарии. Базовая терапия.	**Куликов Александр Вениаминович** (Екатеринбург)
10:10 – 10:40	**Лекция:** Принципы профилактики и коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции.	**Овезов Алексей Мурадович** (Москва)
10:40 – 11:00	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
11:00 – 11:10	**Перерыв. Осмотр выставки**	
11:10 – 11:40	**Лекция:** Инфузионная терапия при критических состояниях.	**Бабаянц Андрей Валерьевич** (Москва)
11:40 - 12:10	**Лекция:** Вопросы оптимизации антибактериальной профилактики и стартовой терапии в родильном доме.	**Беломестнов Сергей Разумович** (Екатеринбург)
12:10 - 12:40	**Лекция:** Акушерское кровотечение: свежезамороженная плазма - все еще золотой стандарт?**	**Роненсон Александр Михайлович** (Тверь)
12:40 – 13:00	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
13:00 – 13:40	**Перерыв**	
13:40 – 14:10	**Лекция:** Современные подходы в лечении железодефицитной анемии.	**Бабаянц Андрей Валерьевич** (Москва)
14:10 - 14:40	**Лекция:** Эмболия околоплодными водами: современные аспекты и клинический случай.	**Роненсон Александр Михайлович** (Тверь)

**- При поддержке компании – спонсора.

ВРЕМЯ	ТЕМА ДОКЛАДА	ДОКЛАДЧИК
14:40 – 15:20	**Представление клинических рекомендаций:** Анестезия и интенсивная терапия при массивном акушерском кровотечении.	**Шифман Ефим Муневич** (Москва)
15:20 - 15:50	**Лекция:** Менеджмент крови пациента в акушерстве. Ведение анемии во время беременности и в послеродовом периоде.	**Куликов Александр Вениаминович** (Екатеринбург)
15:50 – 16:10	**Дискуссия & Вопросы и ответы**	
16:10 – 16:20	**Обязательное анкетирование всех участников**	
16:20 – 16:30	**Подведение итогов Форума**	

Уважаемые коллеги!
Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную** Анкету участника!

МЕРОПРИЯТИЯ

116-й Всероссийский образовательный форум "Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход"

с 17 до 18 октября 2019 г.

620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.185, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", актовый зал

Аккредитовано

Кредитов: 12

Информация о мероприятии

Контакты

Арлюк Евгения Владимировна (тел. 89263796705, e-mail: aaar@arfpoint.ru).

Бабаянц Андрей Валерьевич
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ, ведущий научный сотрудник отдела анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ. (Москва)
e-mail: babayants@gmail.com

Беломестнов Сергей Разумович
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью МЗ СО (Екатеринбург)
e-mail: beldoctor@mail.ru

Жилин Андрей Владимирович
к.м.н., руководитель Областного перинатального центра, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница № 1 г. Екатеринбург (Екатеринбург)
e-mail: zhilinodkb2012@gmail.com

Климко Николай Николаевич
профессор, зав.кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург)
e-mail: n_klimko@mail.ru

Коротчаева Юлия Вячеславовна
к.м.н., доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (Москва)
e-mail: lumis-j@bk.ru

Куликов Александр Вениаминович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология» (Екатеринбург)
e-mail: kulikov1905@yandex.ru

Левит Александр Львович
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, Отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, заведующий ОАР СОКБ (Екатеринбург)
e-mail: al_levit@mail.ru

Матковский Андрей Анатольевич
к.м.н., ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница № 1, ОПЦ (Екатеринбург)
e-mail: matkov96@gmail.com

Овезов Алексей Мурадович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения анестезиологии, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Московской области, председатель Московского областного регионального отделения ФАР (МОНПОАР) (Москва)
e-mail: amolex@mail.ru

Проценко Денис Николаевич
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФДПО ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный врач ГБУЗ «ГКБ № 40» Департамента здравоохранения города Москвы, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)
e-mail: drprotsenko@me.com

Роненсон Александр Михайлович
к.м.н., заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГБУЗ Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной», научный редактор онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии» (Тверь)
e-mail: a.ronenson@mail.ru

Шифман Ефим Муневич
д.м.н., президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии» (Москва)
e-mail: eshifman@mail.ru

Яковлев Сергей Владимирович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), президент Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» (Москва)
e-mail: antimicrob@yandex.ru

Мобильное приложение

Mobile App

Download on the App Store

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

GET IT ON Google Play

ARFPOINT.RU

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association
WWW.ARFPOINT.RU

online журнал Вестник акушерской анестезиологии

№8(22) 2019 Август
online journal Obstetric Anesthesia Digest

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
Obstetrical Anesthesiologists Intensivists Association
WWW.ARFPOINT.RU

online журнал
Вестник акушерской анестезиологии
online journal Obstetric Anesthesia Digest
№8(22)
2019
Август

Содержание

Статья	Стр.
Международные рекомендации применения утеротоников во время операции кесарева сечения	4
Нарушение функции печени на фоне преэклампсии, осложненной ДВС и отслойкой плаценты: клинический случай и литературный обзор	23
«Внимание! Конкурс!»	33

LANCET

На острие медицинских технологий

- Средства визуализации
- Антитромботическая терапия
- Пульмонология
- Анестезиология и реаниматология
- Онкология
- Орфанные заболевания

АО «Ланцет» | 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 3 | т. +7 (495) 646-56-65 | www.lancetpharm.ru

АО «Ланцет» специализируется на комплексном обеспечении профильных лечебно-профилактических учреждений инновационными лекарственными препаратами, высокотехнологичным оборудованием и качественными расходными материалами.

Сегодня «Ланцет» это:

– Работа на всей территории России
– №4 среди госпитальных дистрибьюторов России
– 6 приоритетных направлений:
  - Средства визуализации
  - Антитромботическая терапия;
  - Пульмонология;
  - Анестезиология и реаниматология;
  - Онкология;
  - Орфанные заболевания
– Полноценное комплексное решение от диагностики и лечения на этапе стационара до обеспечения льготных категорий граждан качественными медицинскими продуктами
– Более 60 партнеров – крупнейшие мировые и национальные фармацевтические производители
– Более 1300 клиентов
– Более 7300 позиций в прайс-листе

109147, Российская Федерация,
Москва ул. Воронцовская, д. 35б, корп. 3
Тел/Факс: +7 (495) 646-56-65,
+7 (495) 646-56-66
E-mail: info@lancetpharm.ru
www.lancetpharm.ru

ЭЛИЗАРИЯ®

ЭКУЛИЗУМАБ

- **Первый биоаналог экулизумаба***
- Быстро и стабильно снижает активность терминального комплекса комплемента*
- Предотвращает внутрисосудистый гемолиз у больных пароксизмальной ночной гемоглобинурией*
- Улучшает качество жизни пациентов*

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Элизария®. Регистрационный номер: ЛП-005395-110319. **Фармакодинамика.** Экулизумаб подавляет активность терминального комплекса комплемента человека, обладая высокой аффинностью к его С5-компоненту, вследствие чего полностью блокируется расщепление компонента С5 на С5а и С5b и образование терминального комплекса комплемента С5b-9. Таким образом, экулизумаб восстанавливает регуляцию активности комплемента в крови и предотвращает внутрисосудистый гемолиз у пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ), а также предотвращает избыточную активность терминального комплекса у пациентов с атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС), где причиной заболевания является генетически обусловленная дисрегуляция системы комплемента. С другой стороны, дефицит терминального комплекса комплемента сопровождается повышенной частотой развития инфекций инкапсулированными микроорганизмами, главным образом, менингококковой инфекции. При этом экулизумаб поддерживает содержание ранних продуктов активации комплемента, необходимых для опсонизации микроорганизмов и выведения иммунных комплексов. Лечение препаратом Элизария® сопровождается быстрым и стабильным снижением активности терминального комплекса комплемента. **Показания к применению.** Препарат Элизария® показан для лечения пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией (ПНГ). Эффективность экулизумаба подтверждена у пациентов с гемолизом и сопутствующими клиническими симптомами, свидетельствующими о высокой активности заболевания, вне зависимости от потребности в гемотрансфузиях в анамнезе; атипичным гемолитико-уремическим синдромом (аГУС). **Противопоказания для применения.** Повышенная чувствительность к экулизумабу, белкам хомячков или другим компонентам препарата. Период грудного вскармливания. Активная инфекция Neisseria meningitidis. Отсутствие вакцинации против Neisseria meningitidis (если нет соответствующей профилактической антибиотикотерапии в течение 2 недель после вакцинации). **Способ применения и дозы.** Внутривенно капельно в течение 25–45 минут для взрослых и в течение 1–4 часов для пациентов детского возраста. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия: курс лечения для взрослых пациентов (≥ 18 лет) включает 4-недельный начальный цикл с последующим циклом поддерживающей терапии. Начальный цикл: 600 мг препарата Элизария® 1 раз в неделю в течение 4 недель. Поддерживающая терапия: 900 мг препарата Элизария® на 5-й неделе, с последующим введением 900 мг препарата Элизария® каждые 14 ± 2 дней. Атипичный гемолитико-уремический синдром: курс лечения для взрослых пациентов (≥ 18 лет) включает 4-недельный начальный цикл с последующим циклом поддерживающей терапии. Начальный цикл: 900 мг препарата Элизария® 1 раз в неделю в течение 4 недель. Поддерживающая терапия: 1200 мг препарата Элизария® на 5-й неделе, с последующим введением 1200 мг препарата Элизария® каждые 14 ± 2 дней. **Применение в педиатрии.** Для пациентов с ПНГ и аГУС моложе 18 лет доза препарата Элизария® определяется в зависимости от веса ребенка. **Побочные действия.** Наиболее частым нежелательным явлением при лечении экулизумабом являлась головная боль (отмечалась, главным образом, в начальном цикле терапии). Наиболее тяжелым нежелательным явлением являлся менингококковый сепсис. **Организация, принимающая претензии по качеству и сообщения о нежелательных реакциях от потребителей:** АО «ГЕНЕРИУМ», 601125, Владимирская обл., Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Заводская, стр. 273, т/ф +7 (49243) 72-5-20, 72-5-14, pv@generium.ru.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Элизария® перед его назначением.
Материал предназначен для специалистов здравоохранения.
*Отчет о клиническом исследовании III фазы, N° ECU-PNH-III, 2018. – 285 с.

АО «ГЕНЕРИУМ». 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
Тел./факс: +7 (495) 988-47-94, www.generium.ru

Generium Pharmaceutical

ГЕНЕРИУМ – научно-производственная компания полного цикла – лидер в орфанном сегменте российского фармацевтического рынка.

Компания располагает собственным R&D парком, способным осуществить разработку любого биотехнологического препарата от создания молекулы до начала промышленного выпуска. Научные исследования по отдельным препаратам ведутся совместно с ведущими биотехнологическими компаниями и научными институтами со всего мира.

Производственная площадка компании организована в строгом соответствии с международными стандартами GMP и способна осуществлять выпуск уникального по своему разнообразию ассортимента биотехнологических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов.

Миссия – наши идеи и разработки для спасения жизни и здоровья людей.

Центральный офис:
123112, Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2, офис 726
Тел./факс: +7 495 988-47-94
www.generium.ru

Вторые сутки ОРИТ, почечная недостаточность, сепсис...

...не дайте венозному тромбозу отнять жизнь[1]*

- Единственный НМГ, **не требующий коррекции профилактической дозы** у больных с нарушением функции почек (в т. ч. при клиренсе креатинина <30 мл/мин)[3]**
- **Не противопоказан** для применения у особых групп пациентов (беременность и детский возраст)[2]***
- Единственный НМГ, **одобренный для длительного применения** у онкологических больных (до 6 мес)[2]
- **НМГ выбора** у пациентов с сепсисом и нарушением функции почек (Grade 1A)[4]

Фрагмин®
далтепарин натрия

Помощь в критических ситуациях[2]*

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ФРАГМИН®

Фрагмин® (далтепарин натрия) – антикоагулянтное средство прямого действия. **Показания к применению:** лечение острого тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии; профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального кровообращения во время гемодиализа или гемофильтрации у пациентов с острой или хронической почечной недостаточностью; профилактика тромбообразования при хирургических вмешательствах; профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с терапевтическим заболеванием в острой фазе и ограниченной подвижностью (в том числе при состояниях, требующих постельного режима); нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ; длительное лечение (до 6 месяцев) с целью предотвращения рецидива венозных тромбоэмболических осложнений у больных со злокачественными новообразованиями. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к далтепарину натрия или другим низкомолекулярным гепаринам и/или гепарину; установленная гепарин-индуцированная иммунная тромбоцитопения (тип **I**) в анамнезе или подозрение на ее наличие; кровотечение (клиническое значимое, например, из органов желудочно-кишечного тракта на фоне язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, внутричерепные кровоизлияния); выраженные нарушения системы свертывания крови; острый или подострый инфекционный эндокардит; недавние травмы или оперативные вмешательства на органах центральной нервной системы, органах зрения и/или слуха; у пациентов, получающих терапию препаратом Фрагмин® в лечебных дозах (например, для лечения острого тромбоза глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии, нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ), нельзя использовать локальную и/или регионарную анестезию при плановых хирургических вмешательствах. **С осторожностью:** высокие дозы препарата следует применять с особой осторожностью у больных в раннем послеоперационном периоде. Следует соблюдать осторожность при применении препарата Фрагмин® у пациентов с повышенным риском развития кровотечений. **Способ применения и дозы:** Фрагмин® нельзя вводить внутримышечно! Лечение острого тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Фрагмин® вводится п/к 1-2 раза в сутки. При введении 1 раз в сутки - 200 МЕ/кг массы тела п/к; при введении 2 раза в сутки - по 100 МЕ/кг массы тела п/к. Разовая дневная доза не должна превышать 18 000 МЕ. Профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального кровообращения во время гемодиализа или гемофильтрации. Пациенты с хронической почечной недостаточностью или пациенты без риска развития кровотечения: при продолжительности гемодиализа или гемофильтрации не более 4 часов: в/в струйно по 30-40 МЕ/кг массы тела с последующим в/в капельным введением по 10-15 МЕ/кг/ч либо однократно в/в струйно в дозе 5000 МЕ; при продолжительности гемодиализа или гемофильтрации более 4 часов: в/в струйно по 30-40 МЕ/кг массы тела с последующим в/в капельным введением по 10-15 МЕ/кг/ч. Пациенты с острой почечной недостаточностью или пациенты с высоким риском развития кровотечения: в/в струйное введение 5-10 МЕ/кг массы тела с последующим в/в капельным введением по 4-5 МЕ/кг/ч. Профилактика тромбообразования при хирургических вмешательствах. При проведении операций в общей хирургической практике. Пациенты с риском развития тромбоэмболических осложнений – п/к 2500 МЕ за 2 часа до операции, затем после операции – п/к по 2500 МЕ/сут. Пациенты с дополнительными факторами риска развития тромбоэмболических осложнений – при начале профилактики за день до операции: 5000 МЕ п/к вечером накануне операции, затем по 5000 МЕ п/к каждый вечер после операции; при начале профилактики в день проведения операции: 2500 МЕ п/к за 2 часа до операции и 2500 МЕ п/к через 8-12 часов. Затем со следующего дня каждое утро вводят по 5000 МЕ п/к. При проведении ортопедических операций. Фрагмин® следует вводить в течение до 5 недель после операции: при начале профилактики за день до операции: 5000 МЕ п/к вечером накануне операции, затем по 5000 МЕ п/к каждый вечер после операции; при начале профилактики в день проведения операции: 2500 МЕ п/к за 2 часа до операции и 2500 МЕ п/к через 8-12 часов. Затем со следующего дня каждое утро – по 5000 МЕ п/к; при начале профилактики после операции: 2500 МЕ п/к через 4-8 часов после операции. Затем со следующего дня – по 5000 МЕ п/к в сутки. Профилактика тромбоэмболических осложнений у больных с терапевтическим заболеванием в острой фазе и ограниченной подвижностью. Фрагмин® следует вводить п/к по 5000 МЕ 1 раз в сутки. Нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без подъема сегмента ST на ЭКГ. Фрагмин® вводят п/к по 120 МЕ/кг массы тела каждые 12 часов. Максимальная доза не должна превышать 10 000 МЕ каждые 12 часов. Длительное лечение с целью предотвращения рецидива венозных тромбозов у больных со злокачественными новообразованиями. 1 месяц: 200 МЕ/кг массы тела п/к 1 раз в сутки. Разовая дневная доза не должна превышать 18 000 МЕ. 2-6 месяцев: около 150 МЕ/кг массы тела п/к 1 раз в сутки. **Побочное действие:** отмечаются следующие побочные явления (с частотой ≥ 1%): обратимая тромбоцитопения легкой степени, кровотечение, временное увеличение уровня трансаминаз, подкожная гематома в месте инъекции, боль в месте инъекции. **Передозировка:** чрезмерная доза Фрагмин® может приводить к геморрагическим осложнениям. Антикоагулянтный эффект Фрагмина® можно устранить введением протамина сульфата. Однако протамин обладает ингибирующим действием на первичный гемостаз, в связи с этим его можно применять только в экстренных случаях. 1 мг протамина сульфата частично нейтрализует действие 100 МЕ (анти-Ха) далтепарина натрия. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Форма выпуска:** раствор для внутривенного и подкожного введения. Ампулы (состав на 1 мл): активное вещество: 10 000 МЕ (анти-Ха). Шприцы (состав на 1 шприц): дозировки 2500 МЕ (анти-Ха)/0,2 мл, 5000 МЕ (анти-Ха)/0,2 мл, 7500 МЕ (анти-Ха)/0,3 мл, 10 000 МЕ (анти-Ха)/0,4 мл, 12 500 МЕ (анти-Ха)/0,5 мл, 15 000 МЕ (анти-Ха)/0,6 мл и 18 000 МЕ (анти-Ха)/0,72 мл. Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. **Регистрационные номера:** П N014647/01 от 14.01.2009; П N014647/02 от 16.01.2009; П N012506/01 от 15.07.2011.

1. Гельфанд Б.Р. и соавт. «ЭВИДЕНС» – российское национальное эпидемиологическое исследование в ОРИТ. Клиническая патофизиология. 2015. № 4. С. 54-61. **2.** Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Фрагмин® П N014647/01 130115, П N014647/02-040215, П N012506/01-130115. **3.** Atiq F. et al. Eur J Clin Pharmacol. 2015; 71: 921-929. **4.** Dellinger RP et al. Crit Care Med. 2013 Feb; 41(2): 580-637.

* У больных с ОПН риск развития ВТЭО в 4 раза выше, чем у больных без ОПН. **По зарегистрированным в России. *** Под контролем анти-Ха активности.

ООО «Пфайзер Инновации»:
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
Тел.: +7 495 287 50 00
Факс: +7 495 287 53 00

Информация предназначена только для медицинских работников

PP-FRA-RUS-0043
10.04.2019

Pfizer Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства лекарств. Портфель продуктов компании включает лекарственные препараты, в том числе вакцины, а также хорошо известные во всем мире витамины и другую продукцию, способствующую поддержанию здоровья.

Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и научными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.

Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

www.pfizer.ru

123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)
тел. + 7 (495) 2875000
факс: +7 (495) 2875300
Russia@pfizer.com

Протромплекс 600

ЗАЩИТА СО ВСЕХ СТОРОН

Точность Дозы[1,3]

Экономическая целесообразность малообъемной гемостатической терапии[2]

Сбалансированный состав прокоагулянтов и антикоагулянтов[1,4]

Вирусная безопасность

Краткое описание

Регистрационный номер: ЛСР-010495/08. **МНН или группировочное название:** Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации [Протромбиновый комплекс]. **Лекарственная форма:** лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
Фармакотерапевтическая группа: Гемостатическое средство. **Фармакодинамика.** Факторы свертывания крови II, VII, IX и X вместе формируют протромбиновый комплекс. Синтез этих факторов зависит от витамина К и осуществляется в печени. Фактор VII является зимогеном активного серин-протеазного фактора VIIa, посредством которого инициируется внешний путь свертывания крови. Комплекс тканевой фактор-фактор VIIa активирует факторы свертывания X и IX, в результате чего образуются факторы Xa и IXa. При дальнейшей активации каскада свертывания происходит активация протромбина (фактора II) и его превращение в тромбин. Под действием тромбина фибриноген превращается в фибрин, что приводит к образованию сгустка. Тромбин необходим также для нормального функционирования тромбоцитов и их участия в первичном гемостазе. Применение препарата протромбинового комплекса человека обеспечивает повышение уровней витамин К-зависимых факторов свертывания в плазме и временно устраняет коагуляционные нарушения у пациентов с приобретенным или врожденным дефицитом всех или одного фактора свертывания крови. **Показания к применению.** Лечение и профилактика кровотечений при оперативных вмешательствах у пациентов с приобретенным дефицитом факторов протромбинового комплекса, например, при дефиците, вызванном лечением антагонистами витамина К или их передозировкой, в случаях, когда требуется быстрая коррекция дефицита. Лечение и профилактика кровотечений при оперативных вмешательствах у пациентов с врожденным дефицитом одного из витамин К-зависимых факторов свертывания, в тех случаях, когда недоступен монокомпонентный препарат дефицитного фактора свертывания. **Противопоказания.** Повышенная чувствительность к активным компонентам или к любому из вспомогательных веществ. Аллергия на гепарин или гепарин-индуцированная тромбоцитопения в анамнезе. С осторожностью. Из-за опасности тромбоэмболических осложнений препарат следует применять с осторожностью у пациентов, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, заболевания печени, а также у пациентов в послеоперационном периоде, у новорожденных и у пациентов с высоким риском развития тромбоэмболических осложнений и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. **Применение при беременности и в период грудного вскармливания.** Безопасность применения препаратов протромбинового комплекса человека у беременных женщин и в период лактации не изучалась. Поэтому применение препарата Протромплекс 600 во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только при наличии строгих показаний и если польза от ожидаемого эффекта превышает потенциальный риск для плода и ребенка. **Способ применения и дозы.** Разовую дозу и частоту введения устанавливают индивидуально, с учетом исходных показателей системы свертывания, локализации и выраженности кровотечения, клинического состояния пациента. При назначении пациентам с приобретенным дефицитом факторов протромбинового комплекса, в частности, для лечения и профилактики кровотечений при передозировке непрямых антикоагулянтов – антагонистов витамина К, — при расчете дозы следует ориентироваться на значение либо протромбина по Квику, либо международного нормализованного отношения (МНО), – в зависимости от того, какой показатель определяет лаборатория. **Формулы расчета необходимой дозы:** фактора II: доза (МЕ) = масса тела (кг) x желаемое повышение фактора (%) x 0,5; фактора VII: доза (МЕ) = масса тела (кг) x желаемое повышение фактора (%) x 0,6; фактора IX: доза (МЕ) = масса тела (кг) x желаемое повышение фактора (%) x 1,2; фактора X: доза (МЕ) = масса тела (кг) x желаемое повышение фактора (%) x 0,6. В случае массивного оперативного вмешательства необходим тщательный мониторинг уровня дефицитного фактора свертывания и/или показателя протромбина по Квику и коррекция терапии препаратом Протромплекс 600 в зависимости от динамики этих показателей. Приготовление раствора и его введение. Содержимое флакона с лиофилизатом растворяют непосредственно перед введением. С этой целью необходимо использовать только прилагаемый набор для растворения и введения. **Побочное действие.** При применении концентратов факторов протромбинового комплекса существует риск развития тромбозов/эмболий, диссеминированного внутрисосудистого свертывания и реакций повышенной чувствительности, включая анафилактические реакции и анафилактический шок. При проведении заместительной терапии концентратом факторов протромбинового комплекса возможна выработка циркулирующих антител, ингибирующих один или несколько факторов свертывания. Появление ингибиторов проявляется в виде недостаточного клинического ответа. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. **Передозировка.** Случаи передозировки препаратов протромбинового комплекса не описаны. Основываясь на фармакодинамических свойствах препарата, можно предполагать, что возможными проявлениями передозировки будут тромботические осложнения. **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.** Препараты протромбинового комплекса нейтрализуют эффекты антагонистов витамина К. Исследования по изучению взаимодействия с другими лекарственными средствами не проводились. Несовместимость. Протромплекс 600 нельзя смешивать с другими лекарственными средствами или растворителями, кроме прилагаемой воды для инъекций. **Особые указания.** У пациентов с приобретенным дефицитом факторов свертывания протромбинового комплекса (например, вследствие лечения антагонистами витамина К) Протромплекс 600 применяют в тех случаях, когда необходима быстрая коррекция уровней факторов, в частности, при жизнеугрожающих и тяжелых кровотечениях, особенно ретроперитониальном, церебральном, желудочно-кишечном, а также при необходимости неотложного хирургического вмешательства. В других случаях, как правило, достаточно снижения дозы антагониста витамина К и/или применения витамина К. При возникновении аллергических или анафилактических реакций введение препарата должно быть немедленно прекращено. При повторных введениях препаратов протромбинового комплекса человека, в том числе препарата Протромплекс 600, существует риск развития тромбоза и диссеминированного внутрисосудистого свертывания. **Условия отпуска из аптек.** По рецепту. Претензии потребителей, рекламации по качеству препарата и сообщения о развитии нежелательных реакций принимаются по адресу АО «Эс Джи Биотек» 601125, Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Владимирская, д. 18, офис 26, Тел. (Факс): +7(49243) 7-31-15 (доб. 5205). Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению препарата («ИМП»). Настоящая сокращенная инструкция по применению («СИП») представлена исключительно в информационных целях и не может служить в качестве исчерпывающего руководства при назначении и применении препарата. СИП (V.3) от 06.11.2018 на основании ИМП от 27.07.2018.

Литература:
1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Протромплекс 600, Регистрационный номер ЛСР-010495/08-270718, 2. Kozek-Langenecker SA, Afshari A, Albaladejo P, et al. Management of severe perioperative bleeding: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol. 2013 Jun;30(6):270-382. 3. Barthels M., Von Depka M. Das Gerinnungskompendium// Thieme Verlag, Stuttgart. – 2003. – T. 1. – С. 48-53 4. European PHARMACOPOEIA 5 ed., 2005. 5. Quality Standards of Excellence, Assurance and Leadership, www.pptaglobal.org

ООО «Шайер Биотех Рус» является частью биофармацевтической компании Takeda
119021 г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1, этаж 6, помещение I, ком. № 6, 8, 12.
Телефон: +7 495 787 04 77, Факс: +7 495 787 04 78
www.takeda.com

Дата создания: 08.07.2019
Предназначен для медицинских работников

Takeda

C-APROM/RU/0067

Takeda Pharmaceutical Company Limited (далее Takeda) – глобальная, биофармацевтическая, приверженная ценностям компания с фокусом на научные разработки. Компания с головным офисом в Японии занимает лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке. Takeda стремится заботиться о здоровье и будущем пациентов используя последние достижения науки для создания инновационных лекарственных средств. Научно-исследовательская деятельность компании направлена на разработку новых препаратов в ряде терапевтических областей: онкологии, гастроэнтерологии, неврологии и лечении редких заболеваний, также целевые инвестиции осуществляются в разработку вакцин и препаратов плазмы крови. В фокусе внимания компании – разработка инновационных лекарственных средств, способствующих изменению жизни пациентов. Мы создаем передовые методы лечения на объединенной научно-исследовательской платформе компании, формируя перспективный портфель продуктов в нескольких терапевтических областях. Наши сотрудники, работающие более чем в 80 странах и регионах мира, преданы идее улучшения качества жизни пациентов. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.takeda.com.

ООО «Шайер Биотех Рус» – часть биофармацевтической компании «Такеда»
119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11,
стр.1, этаж 6, пом. I, комн. 6; 8; 12,
тел.: +7 (495) 787-04-77,
www.takeda.com

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол. Специалисты фирмы продолжают работать над созданием новых оригинальных препаратов, 8 из которых поступят на фармацевтический рынок в ближайшие годы. Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности, премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В 2018 году ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» была открыта 3-я очередь фармзавода. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – член Ассоциации Российских фармацевтических производителей и Союза профессиональных фармацевтических организаций.

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН»
Санкт-Петербург, 192102, Россия ул. Салова, д.72,
корп.2, лит. А
Tel.: +7 812 7121379
Fax: +7 812 7108225
E-mail: ovd@polysan.ru
www.polysan.ru

ООО «КОСМОФАРМ» – фармацевтическая компания, созданная в 2006 году.

- В России является представителем фармацевтического концерна Pharmacosmos A/S Denmark (Дания), Protina (Германия), и Sagitus (Латвия).
- Поставляет высококачественную продукцию более чем в 85 регионов и 190 городов страны.
- Строит прочные партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными производителями препаратов парентерального железа, антиретровирусных, противотуберкулезных препаратов, антикоагулянтов, лекарственных препаратов и БАДов.

ООО «КОСМОФАРМ»
Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка,
д.19, корпус 2, помещение 128, комната 7
Тел: (495) 644-00-31
Факс: (495) 644-00-32
www.cosmopharm.ru
E-mail : office@cosmopharm.ru

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов
выражает благодарность компаниям

АО «Ланцет»

АО «Генериум»

ООО «Пфайзер Инновации»

ООО «Шайер Биотех Рус»

ООО «НТФФ «ТОЛИСАН»

ООО «Космофарм»

за помощь в организации и проведении
116-го Всероссийского образовательного форума

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНЕСТЕЗИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ: МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»

который прошел
17-18 октября 2019 года в г. Екатеринбург

Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, член Президиума ФАР, заместитель главного редактора журналов «Анестезиология и реаниматология», «Вестник интенсивной терапии им. А.И. Салтанова», «Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии»

Е.М. ШИФМАН

Вице-президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии, член редколлегии журнала «Анестезиология и реаниматология»

А.В. КУЛИКОВ

АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

Всероссийского образовательного форума
«Теория и практика анестезии и интенсивной терапии:
мультидисциплинарный подход»

АССОЦИАЦИИ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

При получении Свидетельства об обучении Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации
http://www.sovetnmo.ru

2. В «Мероприятиях» выбрать специальность «анестезиология-реаниматология», далее выбрать наше мероприятие – 116-й Всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезии и интенсивной терапии: мультидисциплинарный подход» (г. Екатеринбург, 17-18 октября 2019 года).

3. Добавить учебное мероприятие в «Индивидуальный план обучения».

4. В «Индивидуальном плане обучения» в строке нашего Форума указать «Индивидуальный код подтверждения» и количество кредитов, которые будут указаны в свидетельстве.

С уважением, Организационный комитет Ассоциации

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ФИО _____

Место работы _____

E-mail _____

Контактный телефон _____

Ваши впечатления о Форуме _____

Какие темы, по Вашему мнению, нужно включить в мероприятие / рассматривать более подробно?

_____

_____

Устраивает ли Вас продолжительность лекций и всего мероприятия в целом?

_____

Читаете ли Вы наш онлайн-журнал «Вестник акушерской анестезиологии»?

☐ **да** ☐ **нет**

Пользуетесь ли Вы Мобильным приложением Ассоциации ААР?

_____

Подписаны ли Вы на страницу АААР в Instagram и на Facebook?

_____

Откуда Вы узнали о Форуме?

рассылка по электронной почте ☐ сайт ARFpoint.ru ☐ facebook ☐
приказ Минздрава, информационное письмо ☐
приглашение от компании-участника ☐ другое

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006)

Дата / Подпись

Уважаемые коллеги!
Для получения Свидетельства НМО с кредитными единицами необходимо сдать на стойку регистрации **полностью заполненную** Анкету участника!

Президенту Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов
Шифману Ефиму Муневичу

ЗАЯВЛЕНИЕ

о вступлении в Ассоциацию акушерских анестезиологов-реаниматологов

Прошу принять меня, (ФИО)_____
в качестве члена Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
С текстом Устава Ассоциации ААР ознакомлен и согласен, положения Устава обязуюсь соблюдать и выполнять, нести предусмотренные в нем права и исполнять обязанности члена Ассоциации.

С размером вступительного взноса в размере 100 рублей (ста рублей) 00 коп. и ежегодного членского взноса 200 рублей (двести рублей) 00 коп. согласен и обязуюсь своевременно выплачивать.

Сведения о заявителе:

1. ФИО: .....
2. Дата рождения: .....
3. Адрес регистрации: .....
4. Контактный телефон: .....
5. E-mail: .....
6. Образование: .....
7. Место работы: .....
8. Специальность: .....

Достоверность информации и данных, указанных мною в настоящем заявлении, подтверждаю. Выражаю своё согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006).

_____ _____ _____
дата подпись ФИО

Оплатил вступительный взнос в размере 100 (ста) руб.
И ежегодный членский взнос в размере _____
(сумма прописью)

Общая сумма _____ руб. (_____) рублей
(сумма прописью)

_____ _____ _____
дата подпись ФИО

Президент Ассоциации ААР_____**Е.М. Шифман**_____
подпись дата

А ТЫ ВСТУПИЛ В АССОЦИАЦИЮ?

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА В АААР

- Скидки на регистрационные взносы мероприятий, проводимых АААР
- Онлайн доступ к учебным материалам на официальном сайте Ассоциации
- Онлайн доступ к Клиническим рекомендациям
- Возможность получения персональной рассылки онлайн-журнала «Вестник акушерской анестезиологии»

ARFPOINT.RU

ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА:
Арлюк Евгения
e-mail: aaar@arfpoint.ru
тел.: +7 (926) 379-67-05

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ:
Данилова Лариса
e-mail: reg@arfpoint.ru
тел.: +7 (925) 904-77-64

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ И ЧЛЕНСТВА В AAAP:
Яценко Елена
e-mail: arf@arfpoint.ru
тел.: +7 (916) 343-19-49

ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРСТВА И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
Дубовицкая Юлия
e-mail: info@arfpoint.ru
тел.: +7 (929) 610-05-25

ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:
International cooperation questions
Флока Михаил
e-mail: teh@arfpoint.ru
тел.: +7 (926) 465-56-93

ПО ВОПРОСАМ ДОСТУПА К САЙТУ:
Романов Павел
e-mail: p.romanov@arfpoint.ru

E-MAIL: arf@arfpoint.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.arfpoint.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ АКУШЕРСКИХ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ

АНЕСТЕЗИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Клинические рекомендации
Протоколы лечения

Издание четвертое,
дополненное и переработанное

2019

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Generium
Pharmaceutical

Рекомбинантные технологии для полноценной жизни

Коагил-VII

Эптаког альфа (активированный)

Регистрационный номер: ЛСР-010225/09 от 15.12.2009. Торговое название препарата: Коагил-VII. **МНН**: эптаког альфа (активированный). **Лекарственная форма**: лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения.

1 ФЛАКОН С ПРЕПАРАТОМ СОДЕРЖИТ, мг:

Эптаког альфа (активированный)	1,20 (60 КЕД/ 60 тыс. МЕ)	2,40 (120 КЕД/ 120 тыс. МЕ)	4,80 (240 КЕД/ 240 тыс. МЕ)
натрия хлорид (Eur. Ph.)	5,84	11,68	23,36
кальция хлорида дигидрат (Eur. Ph.)	2,94	5,88	11,76
глицилглицин (Eur. Ph.)	2,64	5,28	10,56
полисорбат-80 (Eur. Ph.)	0,14	0,28	0,56
маннитол (Eur. Ph.)	60,00	120,00	240,00

1КЕД соответствует 1000 МЕ. Растворитель — вода для инъекций. 1 мл приготовленного раствора содержит эптаког альфа (активированный) — 0,6 мг. **Фармакотерапевтическая группа**: гемостатическое средство. Код АТХ: B02BD08.

Показания к применению:
Для остановки кровотечений и профилактики их развития при проведении хирургических вмешательств и инвазивных процедур у пациентов с гемофилией (наследственной или приобретенной) с высоким титром ингибитора к факторам свертывания крови VIII или IX; врожденным дефицитом фактора свертывания крови VII; тромбастенией Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb-IIIa и рефрактерностью (в настоящем или прошлом) к трансфузиям тромбоцитарной массы.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к белкам мышей, хомячков или коров, а также к активному компоненту препарата и вспомогательным веществам.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА. МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Производитель: АО «ГЕНЕРИУМ», Россия
Держатель РУ: АО «Эс Джи Биотех», Россия
Все претензии по качеству и/или нежелательным явлениям на территории РФ отправлять по адресу: АО «Эс Джи Биотех», Российская Федерация, 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Владимирская, д.18, офис 26, тел. +7 (49243) 7-31-15, email: pv@sgbiotech.ru